

MODERNI KLINIKA ARČIAU JŪSŲ

| | |
|------------------------|---|
| REGISTRACIJA | +370 691 11112 |
| SKUBI PAGALBA | +370 691 11112 |
| KLAUSIMAI | info@eradental.lt |
| PLAČIAU APIE PASLAUGAS | https://eradental.lt |
| ADRESAS | Vilnius, Vytauto g. 8 |

ERA ESTHETIC ODONTOLOGIJOS KLINIKA AKTUALI INFORMACIJA

Svarbiausias sėkmingo gydymo etapas, yra tinkamai sudarytas dantų gydymo planas. Sudarant gydymo planą, Era Esthetic specialistai suteiks išsamią informaciją apie gydymo metodą, jo laikotarpį ir įkainius.

Investicija į gražią šypseną atsiperka kiekvieną dieną. Era Esthetic klinikoje pažadame, kad visu Jūsų gydymo procesu rūpinsis išskirtinai daug pasiekę medikai.

Visu gydymo laikotarpiu, pacientams žadame modernią techniką, naujausius gydymo metodus ir užtikrintą komfortą.

GERIAUSI DANTŲ GYDYMO
SPRENDIMAI JUMS IR JŪSŲ ŠEIMAI



ERA ESTHETIC
ESTETINĖS IR LAZERINĖS ODONTOLOGIJOS KLINIKA
DENTAL

BURNOS PRIEŽIŪRA PO BREKETŲ SISTEMOS SUDĖJIMO



Vilnius, Vytauto g. 8
<https://eradental.lt>

BURNOS PRIEŽIŪRA PO BREKETŲ SISTEMOS SUDĖJIMO

Pirmosios dienos po breketų sudėjimo nebus itin malonios. Keletą dienų gali skaudėti dantis, o maisto kandimas ir kramtymas gali kelti diskomfortą. Dantų skausmas ir jautrumas trunka nuo kelių dienų iki savaitės. Ilgainiui mažėja, todėl pirmomis dienomis reikėtų valgyti minkštą, trintą, nekarštą maistą.

Pradėjus gydymą, breketai gali trinti burnos gleivinę lūpų skruostų srityse. Po kelių dienų burnos gleivinė pripranta prie breketų ir žaizdelės užgyja. Kad išvengti diskomforto, rekomenduojame įsigyti specialų ortodontinį vašką ir klijuoti jį ant tų breketų vietų, kurios trinasi į gleivinę ir sukuria nemalonias žaizdeles. Svarbu vašką nuimti prieš valantis dantis.

Viso gydymo laikotarpiu negalima kęsti kietų maisto produktų. Prieš valgydami morkas, obuolius, kriaušes ir pan., susismulkinkite juos peiliu. **Nekramtykite ledinukų.** Venkite kramtyti gumą arba valgyti lipnius kramtomus saldinius - apsivėlusi guma arba saldiniai gali sunkiai išsivalyti.

Po breketų sudėjimo, skausmą maloniai malšina šalti gėrimai ir ledai. Stipriam skausmui malšinti rekomenduojami priešuždegiminiai vaistai. Pavyzdžiui, ibuprofenas.

Viso gydymo laikotarpiu venkite dantų traumų. Pacientams, užsiimantiems kontaktiniu sportu, užsiėmimų metu rekomenduojama dėvėti apsaugines kapas.

Jei gydymo laikotarpiu breketas/jo dalis atsiklijuoja arba atsilenkia lankas, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ortodontą. Išsaugokite nukritusias sistemos dalis ir atsineškite jas ateidami į vizitą.

Visu gydymo laikotarpiu, kas 4-6 mėnesius reikia lankytis pas burnos higienistą ir atlikti profesionalią burnos higieną.

Elastikus ir kitus papildomus aparatus būtina turėti kiekvieno vizito pas ortodontą metu.

Kiekvienam pacientui gydymo laikotarpis yra skirtingas. Nuėmus breketų sistemą, pacientams kurį laiką reikia nešioti retencinius aparatus (ordodontines plokšteles). Aparatai užtikrina, kad dantys ir sąkandis negrįžtų į pirminę būseną.

Dantų higiena ortodontinio gydymo laikotarpiu.

Būtina kiekvieną dieną naudoti vieno danties šepetėlį.

Minkštu dantų šepetėliu, sukamaisiais judesiais reikia valyti visus dantų paviršius, taip pat virš breketų ir po jais.

Eglutės formos tarpdančių šepetėliu valyti vietas tarp breketų.

Tarpdančių siūlu su kietais galais kruopščiai valyti tarpdančius. Patartina vakarais.

Naudoti dozuoto slėgio pulsuojančią vandens čiurkšlę (irigatorių) sunkiai pasiekiamoms apnašoms išvalyti.

Dantų valymo procedūra užbaigti burną išskalaujant skalavimo skysčiu.

