

# MODERNI KLINIKA ARČIAU JŪSŲ

REGISTRACIJA	+370 691 11112
SKUBI PAGALBA	+370 691 11112
KLAUSIMAI	info@eradental.lt
PLAČIAU APIE PASLAUGAS	<a href="https://eradental.lt">https://eradental.lt</a>
ADRESAS	Vilnius, Vytauto g. 8

GERIAUSI DANTŲ GYDYMO  
SPRENDIMAI JUMS IR JŪSŲ ŠEIMAI

## ERA ESTHETIC ODONTOLOGIJOS KLINIKA AKTUALI INFORMACIJA

Vienas iš svarbiausių sėkmingo gydymo etapų yra tinkamai sudarytas dantų gydymo planas. Sudarant gydymo planą, Era Esthetic Dental specialistai suteiks išsamią informaciją apie gydymo metodus, jų alternatyvas, gydymo trukmę ir įkainius. Visais atvejais sudarant gydymo planą atsižvelgsime į Jūsų lūkesčius.


Era Esthetic Dental odontologijos klinikoje užtikriname, kad visu Jūsų gydymo procesu rūpinsis išskirtinai daug pasiekę medikai, bus naudojama moderni įranga ir užtikrinamas maksimalus pacientų komfortas.

Sudėtingoms dantų problemoms spręsti pasitelkiama kelių skirtingų specializacijų medikų komanda.



ERA ESTHETIC  
ESTETINĖS IR LAZERINĖS ODONTOLOGIJOS KLINIKA  
DENTAL

BENDRINĖ NEJAUTRA  
VAIKAMS.  
KAIP ELGTIS *PRIEŠ* IR *PO*?  
*ATMINTINĖ TĖVAMS*



Vilnius, Vytauto g. 8  
<https://eradental.lt>

## BENDRINĖ NEJAUTRA VAIKAMS

### Pasiruošimas.

Bendrajai nejautrai yra būtina ruoštis iš anksto. Kelias dienas prieš procedūrą neplanuokite varginančios veiklos (pvz.: tolimų išvykų, didesnių švenčių), o naktį prieš procedūrą su visa šeima gerai išsimiegokite.

Vaikui ypatingai svarbus Jūsų palaikymas. Stenkitės nerodyti savo baimės arba nerimo. Nesakykite vaikui, kad „teks pakentėti“, neskatininkite jo „neverkti“.

Likus keletai dienų iki anestezijos, užsiminkite apie artėjančią procedūrą. Dalykiškai susitarkite, kad reikės „pripūsti balionėlį“ ir bus atliktas „skiepukas“. Pažadėkite vaikui kažką, ko jis norėtų (pavyzdžiui: ledų porciją, mažą dovanėlę ar mėgstamą pramogą).

### Paciento sveikatos būklė.

Mažasis pacientas prieš planinę procedūrą negali sirgti ūmine liga. Sloga, kosulys, karščiavimas, virusinės infekcijos ar kitos ligos gali sukelti rimtų komplikacijų.

Rekomenduojama, kad po persirgtos ūminės ligos būtų praėjusios ne mažiau kaip 2 savaitės. Apie bet kokią sveikatos būklės pakitimą būtinai informuokite gydytoją anesteziologą.

Iš anksto informuokite jeigu vaikas yra alergiškas, serga lėtine liga, įgimta liga, yra patyręs traumų arba operacijų.

Atvykstant nejautrai, su savimi turėkite svarbius vaiko medicininius dokumentus (išrašus, tyrimų duomenis, konsultacijų išvadas ar kt.).

### Maistas ir gėrimai.

Mažasis pacientas turi būti nieko nevalgęs ir negėręs pieno, balintų gėrimų, sulčių su minkštumu, maitinimo mišinių) bent 6 valandas iki procedūros pradžios. Kūdikis motinos pieno turi būti negėręs daugiau kaip 4 valandas.

Skaidrių skysčių (vandens, mineralinio vandens, arbatos, vaisvandenių, sulčių be minkštimo) negalima gerti bent 2 valandas iki procedūros. Taip pat negalima čiupti saldainių, ledinukų, kramtyti gumos.

Jeigu procedūra yra numatyta anksti ryte, geriausiai nevalgyti ir negerti jau po vidurnakčio. Jei vizitui paskirtas vėlesnis laikas, laikantis aukščiau pateiktų nurodymų, ryte galima lengvai užkąsti, atsigerti saldintos arbatos.

Šių nurodymų nesilaikymas nejautos metu gali sukelti gyvybei grėsmingas komplikacijas - skrandžio turinio atpylimą ir jo patekimą į kvėpavimo takus.

Pasirūpinkite, kad namuose, pasiekiamose vietose nebūtų maisto. Apie šiuos reikalavimus informuokite ir kitus šeimos narius.

Skaidrius skysčius leidžiama gerti po procedūros praėjus 2 valandoms. Su gydytojo anesteziologo leidimu ir anksčiau, jeigu nesvaigsta galva ir nepykina.

Minkštą ir švelnų maistą galima valgyti praėjus vietinės nejautos sukeltam burnos, žandų, liežuvio aptirpimui, arba kada leidžia gydytojas odontologas. Vaikui negalima duoti sprangaus, sunkiai kramtomo maisto (riešutų, sausainių ar pan.)

### Apranga.

Procedūros dieną, aprenkite vaiką patogiais (venkite griaužiančių etikečių, sintetinių audinių), judesių nevaržančiais, lengvai atsagstomais drabužiais. Apaukite vaiką patogia avalyne.

Atsiminkite, net labai saugantis, tiek vaiko, tiek lydinčio asmens drabužiai gali išsitepti.

Jei vaikas dar neatpratintas nuo sauskelnų, turėkite kelias atsargines. Jei neseniai priprato prie puoduko - turėkite bent vienas atsargines kelnaites ir viršutinių rūbėlių komplektą.

### Lydintys asmenys.

Mažąjį pacientą turi lydėti tėvai arba globėjai. Globėjams reikalingas globos teisę patvirtinantis dokumentas.

Rekomenduojama, kad po procedūros vaiką lydėtų du suaugę asmenys. Ypatingai, jeigu vienam iš jų reikia vairuoti automobilį. Pasirūpinkite, kad automobilis būtų aprūpintas saugos kėdute, kuri atitinka vaiko amžių.

Jeigu vaiko negali lydėti 2 suaugę asmenys, verčiau grįžkite namo taksi. Viešasis transportas nerekomenduojamas.

### Grįžus namo po nejautos.

Sugrįžus su mažuoju pacientu namo, šis gali būti irzlus, apatiškas, mieguistas. Gali būti sutrikusi vaiko koordinacija, todėl griežtai negalima palikti jo vieno. Neleiskite vaikui bėgioti, lipti laiptais ir pan. Visą likusią dieną paskirkite atidžiai vaiko priežiūrai ir poilsiui.

Pakilus temperatūrai, naudokite įprastas temperatūros mažinimo priemones.

Atsiradus gyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams (oro trūkumui, apsunktinam kvėpavimui, springimui, alpimui ar pan.) skubiai kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu 112. Medicinos personalą informuokite apie taikytą nejautrą ir patirtą odontologinę procedūrą.